



Es incoloro, no mancha y no deja olor



COMPOSICIÓN

Cada 100 g de gel contiene:

Thiamethoxam (CAS 153719-23-4).....	0,1 g
Benzoato denatonio	0,0002 g
Ingredientes inertes csp.....	100 g

Uso Doméstico y Profesional

Contenido Neto: 30 gramos

Fabricado por: WellMark Internacional Estados Unidos por cuenta de: Syngenta Crop Protection, Inc. Estados Unidos.bajo licencia de Syngenta Crop Protection, Basilea, Suiza y/o Syngenta Protecao de cultivos Ltda., SP, Brasil.

Importa y Distribuye: Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago - Chile, Teléfono: (2) 941 0100. **Registro ISP N° P - 545/14**

Consultas al fono (2) 941 0100 o al mail productos.profesionales@syngenta.com

PRODUCTO DE BANDA VERDE

Cuidado

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE

USAR EL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN OPTIGARD® GEL HORMIGUICIDA

- Es un Cebo (atrayente) Listo Para Usar para el control de una amplia gama de especies de hormigas.
- Posee una atractiva formulación de gran eficacia contra las hormigas.
- No es repelente para las hormigas lo que permite que sea transferido al resto de la colonia (efecto de transmisión).
- Es un novedoso concepto de aplicación, ya que no es necesario desalojar el recinto.
- Tiene un excelente perfil ambiental, es incoloro, no deja olor y no mancha.
- Puede utilizarse ampliamente en viviendas, áreas de alimento, áreas públicas, hospitales, colegios e industrias tanto en interior como exterior.
- Contiene **Bitrex®**, amargante que previene la ingestión accidental en niños, aumentando la seguridad en su uso.

MÁS INFORMACIÓN DE OPTIGARD® GEL HORMIGUICIDA

- Es muy estable y mantiene su palatabilidad y atracción por varios días.
- Actúa por ingestión y las hormigas disminuyen su actividad después de 2 a 3 días de alimentarse del cebo.
- No es volátil y puede utilizarse sin necesidad de desalojar el recinto.

INSTRUCCIONES DE USO

- **OPTIGARD® Gel Hormiguicida** viene listo para su uso en una jeringa de aplicación.
- Se debe quitar la tapa de la jeringa de **OPTIGARD® Gel Hormiguicida** y presionar lentamente el émbolo para permitir la salida de producto.
- Aplicar finas líneas de **OPTIGARD® Gel Hormiguicida** de acuerdo al cuadro de recomendación.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

DOSIS OPTIGARD® Gel Hormiguicida	LUGAR	RECOMENDACIÓN	IMPORTANTE
Aplicar una fina línea de 1 a 2 cm de longitud en varios puntos según sea el nivel de infestación	Interior y Exterior	Interior Aplicar en aquellos lugares donde las hormigas son vistas caminando, comiendo o anidando. Ejemplo: grietas; hendiduras; espacios vacíos; caminos; marcos de puertas y ventanas; debajo de muebles de cocina; lavadero; cañerías interiores; baños, etc. Exterior Aplicar en lugares próximos a la entrada a la vivienda o recinto; en puntos de alta concentración de humedad como, aleros, cables, tubos que entran a la construcción; nidos, etc.	<ul style="list-style-type: none">• No tratar áreas que son lavadas rutinariamente.• No aplicar en lugares donde se preparan alimentos o sobre utensilios de cocina.• Si el área a tratar ha sido tratada con insecticida, se deberá limpiar a fondo antes de aplicar el cebo gel.• No aplicar insecticida sobre el gel para no causar repelencia.• Evitar la exposición del Cebo de OPTIGARD® Gel Hormiguicida al sol directo, altas temperaturas o exceso de humedad, ya que pueden reducir la durabilidad y efectividad del producto.

MANEJO INTEGRADO DE HORMIGAS

Para una mayor efectividad de **OPTIGARD® Gel Hormiguicida** es importante reducir las fuentes de alimento de las Hormigas como es la mielecilla que generan los insectos chupadores en plantas ornamentales (ej: pulgones, conchuelas, etc.), especialmente en aquellos lugares próximos a la entrada de la vivienda o recinto.

Syngenta recomienda aplicar **OPTIGARD® 25 WG** para el control de insectos chupadores en plantas ornamentales.

Grupo químico: Neonicotinoide.

Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado, Puede ser peligroso) Producto de Banda Verde.

Condición de Venta: General.

APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- No aplicar sobre utensilios de alimentos o en superficies donde se preparan alimentos.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y mascotas.
- No aplicar ni botar sobrantes de **OPTIGARD® Gel Hormiguicida** sobre cursos de agua. Tóxico para organismos acuáticos y vidas silvestres.
- Una vez vacío el envase, disponer en contenedor de basura.
- Altamente tóxico para abejas, no aplicar cerca de plantas en floración ni durante horas de mayor actividad de insectos benéficos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de una intoxicación, detener el trabajo y llamar de inmediato a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar inmediatamente con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acudir al médico.
- Si accidentalmente **OPTIGARD® Gel Hormiguicida** es ingerido, NO provocar el vómito y llevar a la persona junto con este envase inmediatamente al médico. Mantener al afectado abrigado y en reposo.

TRATAMIENTO MÉDICO

- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Este producto no tiene antídoto específico.
- Efectuar lavado gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos. Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.**

- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800, Santiago, Chile.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): 2) 941 0100, Santiago, Chile.



Codigo de Barra:

syngenta