

Chemotrina®

INSECTICIDA ♦ CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICION: Praletrina 2 % - Butóxido de Piperonilo 10 %.

FORMULACION: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACION: Envase por 1 litro (Caja por 12 unidades).

CARACTERISTICAS: CHEMOTRINA® está compuesto por un ingrediente activo perteneciente a la familia de los piretroides que posee una toxicidad moderada en mamíferos y una acción de volteo inmediata. Gran capacidad de desalojo y muy baja residualidad debido a su fotolabilidad. Su gran capacidad insecticida permite realizar tratamientos sumamente efectivos con mínimas cantidades de ingrediente activo. El Butóxido de Piperonilo es un inhibidor de las oxidasas de función mixta (enzimas que degradan piretroides). Este compuesto genera un gran sinergismo con el ingrediente activo, ideal para situaciones donde las poblaciones de insectos han desarrollado resistencia.

ESPECTRO DE ACCION: Insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas, etc.). Insectos rastreros (cucarachas, vinchucas, chinches, hormigas, pulgas, piojos, etc.). Utilizado fundamentalmente en situaciones de presencia de plagas intradomiciliarias que requieran volteo inmediato y baja residualidad.

SITIOS DE EMPLEO: Puede aplicarse en combinación con otros insecticidas. En interiores en todo tipo de edificios: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, instalaciones deportivas, granjas, tambos, depósitos, etc. En exteriores: countries, jardines, parques, paseos, balnearios, etc.

MODO DE EMPLEO: CHEMOTRINA® puede aplicarse con equipos manuales o motor, sola o en mezclas. Logra espontáneamente una emulsión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización, pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondites, sitios de reposo o reproducción. No mezclar con productos o aguas alcalinas. En caso de utilizarse para control de insectos sociales (avispa, abejas, hormigas, etc.), deberá pulverizarse directamente sobre los nidos (hormigueros, panales, etc.) utilizando la dosis recomendada. Una vez muertos los insectos debe procederse a la destrucción o remoción de nidos para evitar la reinfestación.



DOSIS DE USO	Cantidad de Formulado para 100 m ²
Insectos rastreros	65 ml cada 5 litros de agua
Insectos voladores	65 ml cada 5 litros de agua



CHEMOTECNICA
DIVISION SALUD AMBIENTAL

